

# Multi-Mam® BabyDent



LÆS HELE INDLÆGSSEDLEN IGennem INDEN DU ANVENDER MULTI-MAM BABYDENT OG GEM TIL SENERE BRUG

## MULTI-MAM BABYDENT TIL TANDFREMBRUD

- Beroligende gel til babyer med tandfrembrud
- En behagelig smag
- Sukkerfri og påvirker ikke tænderne

## HVORDAN FUNGERER MULTI-MAM BABYDENT

Multi-Mam BabyDent danner et blødt beroligende lag over det berørte tandkød. Multi-Mam BabyDent gel er baseret på det patenterede 2QR-kompleks. Denne naturlige, plantebaserede ingrediens har den unikke evne til at reducere skadelige bakterier ved kontakt med tandkødet. Multi-Mam BabyDent beroliger ubehag og reducerer irritation forårsaget af tandfrembrud.

## BRUGSANVISNING

Påfør gelen i rigelig mængde på det følsomme tandkød, så ofte som den beroligende effekt ønskes. Dup forsigtigt babyens tandkød med en ren, tør og absorberende klud for at fjerne overskydende fugt, inden gelen påføres. Massér gelen på tandkødet med en ren finger eller en lille blød tandbørste. For at opnå maksimal kontakttid skal babyen undgå at spise og drikke i 30 minutter efter påføring.

For ekstra beroligende effekt kan Multi-Mam BabyDent opbevares i køleskabet (2-8°C).

En anden god måde at anvende produktet på er at anbringe noget gel direkte på babyens sut eller bidering på steder, hvor det kommer i kontakt med tandkødet.

Maksimal brug er 15 g (1 tube) pr. dag.

### Savi

Multi-Mam BabyDent er en behagelig blød gel, som også kan bruges til hududslæt forårsaget af savi.

### Brugsanvisning ved hududslæt pga. savi

Påfør en lille mængde af gelen på den irriterede hud omkring munden.

## MULTI-MAM BABYDENT ER BASERET PÅ 2QR-KOMPLEKS

Multi-Mam BabyDent er et naturprodukt baseret på det patenterede 2QR-kompleks. Produktet indeholder ikke alkohol og ingredienser af animalsk oprindelse.

## INGREDIENTS

Aloe Barbadensis leaf extract, Aqua, Glycerin, Betaine, Xanthan Gum, Sclerotium gum, Xylitol, Citric Acid, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Laureth-9, Hyaluronic Acid, Sodium Hydroxide.

Hovedingrediens 2QR-kompleks: Patenteret ingrediens udvundet af Aloe Barbadensis bladekstrakt.

## ALLERGIINFORMATION

Allergi over for ingredienserne i Multi-Mam BabyDent er meget sjældne. Hvis du er i tvivl, skal du anvende en lille smule gel på indersiden af underarmen og lade det sidde et stykke tid. Hvis der opstår en kløende rød plet, anbefales det ikke at bruge Multi-Mam BabyDent.

## OPBEVARING

Opbevar Multi-Mam BabyDent i originalemballagen utilgængeligt for børn ved en temperatur mellem 2-25°C. Udløbsdatoen er trykt på tuben og på emballagen.

## BAGGRUNDSINFORMATION OM KRING TANDFREMBRUD

Tandfrembrud er den proces, hvorpå en babys tænder bryder frem eller bryder igennem tandkødet. Normalt sker tandfrembruddet, når babyen er mellem 6 og 24 måneder, men nogle gange tidligere.

## Beskrivelse af ubehag ved tandfrembrud

De første tegn og symptomer på tandfrembrud er: at babyen putter hænder eller andet i munden, at babyen savler og at tandkødet hæver og gør ondt, hvor tænderne bryder igennem. Nogle gange kan babyens kind være rød (den ene side). De fleste tegn viser sig ofte fra ca. 4 dage før til 3 dage efter tanden er brudt igennem. Ved tandfrembrud kan babyen have forskellige problemer. Normalt vil det være lokalt som: irritation af tandkød og kæbe, hævet tandkød og savi; eller flere symptomer, der kan påvirke hele kroppen som: feber, diarré og lav modstandskraft, uro, forstyrret søvn eller spiseproblemer.

## OBS!

Diarré, feber og udslæt skyldes ikke altid tandfrembrud.

Hvis din baby har disse symptomer, og du ikke kender årsagen, anbefales det at kontakte din læge.

## Ubehag/hævelse ved tandfrembrud

Tandfrembrud er generelt forbundet med ubehag i tandkød og kæber, da babyens tand forbereder sig på at bryde igennem tandkødets overflade. Når tanden bryder igennem, kan tandkødet ofte blive lidt rødt eller hævet. Babyen kan begynde at bide i ting for at hjælpe tanden på vej op. Normalt begynder symptomerne ca. 4 dage før og varer til ca. 3 dage efter tanden er brudt igennem. I den periode kan babyen være urolig.

## Savi i forbindelse med tandfrembrud

Ved tandfrembrud producerer babyen mere spyt, hvilket medfører, at babyen savler. Spyt bidrager til at fugte og smøre det ømme tandkød. Det hævede tandkød giver ubehag og vil ofte få babyen til at putte fingre eller legetøj i munden. Overproduktion af spyt kan forårsage udslæt rundt om munden.

## Gode råd ved tandfrembrud

- Massér babyen tandkød med en ren finger, kold vaskeklud eller en fugtet kompres.
- Det kan hjælpe at give babyen noget hårdt at tygge og bide i, f.eks. en bidering.
- Giv babyen kølige (ikke frosne) ting at bide i, f.eks. en afkølet bidering.
- Giv babyen noget koldt vand at drikke.
- Hold huden omkring munden tør med en blød klud for at modvirke udslæt.