



MULTI-MAM BABYDENT ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΦΥΪΑ

- Ανακουφιστικό τζελ για μωρά σε φάση οδοντοφυΐας
- Με βάση φυσικά συστατικά
- Με ευχάριστη γεύση
- Χωρίς ζάχαρη, δεν επηρεάζει τα δόντια

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-MAM BABYDENT

Το Multi-Mam BabyDent σχηματίζει μια απαλή ανακουφιστική επίστρωση πάνω στα ερεθισμένα ούλα. Το τζελ Multi-Mam BabyDent βασίζεται στο πατενταρισμένο σύμπλοκο 2QR. Αυτό το φυσικό, φυτικής προέλευσης συστατικό έχει τη μοναδική ιδιότητα να εμποδίζει τα βλαβερά βακτήρια να έρχονται σε επαφή με τα ούλα. Το Multi-Mam BabyDent ανακουφίζει από τις ενοχλήσεις και μειώνει τον ερεθισμό που προκαλείται από την οδοντοφυΐα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμόστε άφθονη ποσότητα τζελ στα ευαίσθητα ούλα όσο συχνά είναι επιθυμητό για να υπάρξει ανακούφιση. Περάστε απαλά ένα καθαρό, στεγνό, απορροφητικό πανάκι ή μια γάζα πάνω από τα ούλα του μωρού για να απομακρύνετε την περίσσεια υγρασία προτού εφαρμόσετε το τζελ. Τρίψτε απαλά το τζελ πάνω στα ούλα με καθαρό δάκτυλο ή μια μικρή μαλακή οδοντόβουρτσα. Για να διασφαλιστείται μέγιστος χρόνος επαφής με τα ούλα, να αποφεύγεται η πόση υγρών για 30 λεπτά μετά την εφαρμογή.

Για μεγαλύτερη ανακούφιση, το Multi-Mam BabyDent μπορεί να φυλάσσεται στο ψυγείο (2-8°C).

Ένας άλλος κατάλληλος τρόπος εφαρμογής είναι να τοποθετήσετε λίγο τζελ απευθείας επάνω στην πιπίλα ή στον κρίκο οδοντοφυΐας σε σημεία που θα έρθουν σε επαφή με τα ούλα.

Η μέγιστη ποσότητα χρήσης είναι 15g (1 σωληνάριο) ανά ημέρα.

Σιελόρροια

Το Multi-Mam BabyDent είναι ένα ευχάριστο απαλό τζελ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για τα εξανθήματα που προκαλούνται στο δέρμα από τη σιελόρροια.

Οδηγίες χρήσης σε περίπτωση σιελόρροιας:

Εφαρμόστε μικρή ποσότητα τζελ επάνω στο ερεθισμένο δέρμα γύρω από το στόμα.

ΤΟ MULTI-MAM BABYDENT ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το Multi-Mam BabyDent είναι ένα φυσικό προϊόν, βασισμένο στο πατενταρισμένο σύμπλοκο 2QR. Δεν περιέχει αλκοόλη ή συστατικά ζωικής προέλευσης.

INGREDIENTS

Aloe Barbadensis leaf extract, Aqua, Glycerin, Betaine, Xanthan Gum, Sclerotium gum, Xylitol, Citric Acid, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Laureth-9, Hyaluronic acid, Sodium hydroxide.

Κύριο συστατικό σύμπλοκο 2QR: Πατενταρισμένο συστατικό με καθαρισμό εκχυλίσματος φύλλων αλόης (Aloe Barbadensis).

ΑΜΕΡΙΕΣ

Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα συστατικά του Multi-Mam BabyDent είναι πολύ σπάνιες. Εάν έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε μικρή ποσότητα Multi-Mam BabyDent στην εσωτερική πλευρά του αντιβραχίου και αφήστε το για λίγα ώρα. Εάν εμφανιστεί κόκκινο σημάδι με κνησμό, σας συστήνουμε να μην χρησιμοποιήσετε το Multi-Mam BabyDent.

ΦΥΛΑΞΗ

Να φυλάσσεται το Multi-Mam BabyDent σε σημείο όπου δεν το φθάνουν παιδιά, στην αρχική συσκευασία, σε θερμοκρασία μεταξύ 2°C και 25°C. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται επάνω στο σωληνάριο και το κουτί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΦΥΪΑ

Η οδοντοφυΐα είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα δόντια του μωρού ξεπροβάλλουν μέσα από τα ούλα. Η οδοντοφυΐα συνήθως εμφανίζεται σε ηλικία μεταξύ 6 και 24 μηνών, αλλά κάποιες φορές και νωρίτερα.

Επεξήγηση των ενοχλήσεων που εμφανίζονται κατά την οδοντοφυΐα

Τα πρώτα σημάδια και συμπτώματα της οδοντοφυΐας είναι: τα μωρά να βάζουν τα χέρια ή άλλα αντικείμενα στο στόμα τους, να έχουν σιελόρροια (τρέχουν τα σάλια τους) και να πρήζονται τα ούλα εκεί όπου θα βγουν τα δόντια. Μερικές φορές κοκκινίζει το ένα μάγουλο των παιδιών. Τα περισσότερα σημάδια εμφανίζονται όταν ξεπροβάλλουν οι κύριοι κοπτήρες, τέσσερις ημέρες πριν έως και τρεις ημέρες μετά την εμφάνιση του δοντιού. Κατά τη διάρκεια της οδοντοφυΐας, τα βρέφη μπορεί να έχουν διάφορα προβλήματα. Στα απλά τοπικά προβλήματα συμπεριλαμβάνονται η ενόχληση στα ούλα και τη γνάθο, το πρήξιμο στα ούλα, η σιελόρροια. Οι πιο συστηματικές ενοχλήσεις περιλαμβάνουν πυρετό, διάρροια και χαμηλή αντοχή, και τα προβλήματα συμπεριφοράς μπορεί να εκδηλώνονται με ευερεθιστότητα, διαταραχές στον ύπνο ή στο φαγητό.

Σημείωση!

Η διάρροια, ο πυρετός και το εξάνθημα δεν σχετίζονται πάντοτε με την οδοντοφυΐα.

Εάν το μωρό σας έχει αυτά τα συμπτώματα και δεν γνωρίζετε την αιτία, σας συστήνουμε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας.

Ενοχλήσεις/οίδημα κατά τη διάρκεια της οδοντοφυΐας

Η οδοντοφυΐα γενικά σχετίζεται με ενοχλήσεις στα ούλα και τη γνάθο, καθώς η βρεφικά δόντια ετοιμάζονται να βγουν από την επιφάνεια των ούλων. Καθώς το δόντι κινείται κάτω από την επιφάνεια του ούλου, η περιοχή μπορεί να φαίνεται ελαφρώς κόκκινη ή πρησμένη. Τα μωρά μπορεί να αρχίσουν να δαγκώνουν διάφορα αντικείμενα για να βοηθήσουν το ούλο να ανοίξει. Τα συμπτώματα συνήθως αρχίζουν 4 ημέρες πριν έως και 3 ημέρες μετά την εμφάνιση του δοντιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το μωρό μπορεί να είναι εννευρισμένο.

Σιελόρροια κατά τη διάρκεια της οδοντοφυΐας

Στην περίοδο της οδοντοφυΐας τα μωρά παράγουν περισσότερο σάλιο, γεγονός που προκαλεί σιελόρροια. Το σάλιο βοηθά κατά τη φάση της οδοντοφυΐας, καθώς υγραίνει και λιπαίνει τα ευαίσθητα ούλα. Τα ούλα πρήζονται, κάτι που προκαλεί ενόχληση και δημιουργεί στα βρέφη την ανάγκη να βάζουν στο στόμα τα δάκτυλά τους ή παιχνίδια. Το πολύ σάλιο που ξεχειλίζει συνεχώς από το στόμα μπορεί να προκαλέσει εξάνθημα γύρω από το στόμα.

Συμβουλές για την περίοδο της οδοντοφυΐας

- τρίψτε/μαλάξτε τα ούλα του μωρού σας με καθαρό δάκτυλο, ένα κρύο πανάκι ή ένα υγρό κομμάτι γάζας.
- μπορεί να βοηθήσει εάν δώσετε στο μωρό σας να μασήσει κάτι σκληρό, όπως έναν κρίκο οδοντοφυΐας.
- δώστε στο μωρό να μασήσει δροσερά (όχι παγωμένα) πράγματα, όπως έναν κρύο κρίκο οδοντοφυΐας.
- δώστε στο μωρό να πει δροσερό νερό.
- η σιελόρροια συνοδεύει την οδοντοφυΐα, επομένως κρατήστε το δέρμα στεγνό με ένα απαλό πανάκι για να αποφύγετε τους ερεθισμούς του δέρματος.

Διανομέας:

Virtus Pharma Μ.Ε.Π.Ε., Τατσίου 97Α & Μάνης,
14451 Μεταμόρφωση, Αττική, Ελλάδα
Τηλ.: +30 2105787113-4, Fax: +30 2105787148
www.virtuspharma.com

BioClin BV

Blaak 555, 3011 GB Rotterdam
Ολλανδία